

ABSTRAK

GAMBARAN MINAT HUBUNGAN SEKSUAL IBU HAMIL TRIMESTER III DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

OLEH: DEWI WULANDARI

Hubungan seksual merupakan salah satu bagian penting dalam menyatakan perasaan kasih sayang, rasa aman dan tenang, kebersamaan dan kedekatan perasaan dalam hubungan suami istri . Banyak pasangan yang merasa khawatir bahwa seks selama kehamilan trimester III dapat menyebabkan keguguran, tetapi sesungguhnya hubungan seksual dalam kehamilan trimester III dapat menyebabkan masalah jika kehamilan dengan resiko tinggi atau dokter mengantisipasi adanya kemungkinan komplikasi. Beberapa kepustakaan menganjurkan agar hubungan seksual mulai dihentikan pada 3-4 minggu terakhir menjelang perkiraan tanggal persalinan. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran minat hubungan seksual ibu hamil trimester III.

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif*. Populasi dalam penelitian adalah semua ibu hamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sejumlah 120 responden. Tehnik sampling yang digunakan adalah random sampling dengan jumlah sampel 30 responden. Tehnik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan dan analisa data menggunakan *editing, coding, scoring, tabulating* dan *skor T*.

Hasil penelitian dari 30 responden didapatkan sebagian besar responden mempunyai minat positif dalam melakukan hubungan seksual pada trimester III sebesar 13 responden (43,33%) dan minat negatif sebesar 17 responden (56,67%)

Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya mengenai hubungan tingkat pendidikan dengan minat ibu hamil trimester III dalam melakukan hubungan seksual trimester III.

Kata kunci: Minat Hubungan Seksual, Ibu Hamil Trimester III

ABSTRAK

Illustration of Volunter Sexual Intercourse Pregnancy Woman Of Three Trimester At Public Working Area, Subdistrict Of Sukorejo, Regency Of Ponorogo

By: Dewi Wulandari

Sexual intercourse is one important part of expressing feeling of love, a sense of security and calm, a feeling of togetherness and closeness in the relationship of husband and wife. Many couples worry that pregnancy during pregnancy can lead to miscarriage, but actual sexual intercourse in the three trimesters of pregnancy can be a problem if the high risk pregnancy or doctor anticipates the possibility of complication. Some literature suggests that sexual intercourse started discontinued last 3-4 weeks ahead of the expected date of childbirth to describe sexual intercourse interest pregnancy women of three trimesters.

The kind of the research is descriptive, the populations of this research are all volunteers of posyandu at Sukorejo Ponorogo 120 respondents. The method of research is cross-sectional. We used total sampling, the number of samples are 30 respondents. The technique of collecting data is by questionnaire, organizing and analyzing data by editing, coding, scoring, tabulating and skor T.

The results of the research from 30 respondents found 13 respondents are high interest, 43.33% (Forty three point thirty three percentage) while 17 respondents are low interest 56.67% (Fifty six point sixty seven percentage).

This research is recommended to next follow up research about relationship with education level interest pregnancy women of three trimesters in sexual intercourse three trimesters

Key Words: Interest Sexual Intercourse , Pregnancy Woman Of Three Trimesters